



Lake Mead



National Recreation Area

[ver mapa](#)

tamaño del texto: [A](#) [AA](#) [AAA](#)

[versión para imprimir](#)

[PÁGINA DE INICIO DEL PARQUE](#)

[PLANIFIQUE SU VISITA](#)

[FOTOGRAFÍA Y MULTIMEDIA](#)

[HISTORIA Y CULTURA](#)

[NATURALEZA Y CIENCIA](#)

[Animales](#)

[Plantas](#)

[Factores ambientales](#)

► [Dermatitis por cercaria](#)

[Algas verdes](#)

[Especies invasoras](#)

[Restricciones sobre el uso del fuego](#)

[Restauración de la tierra](#)

[Parque amistad terrestre](#)

[Características naturales y ecosistemas](#)

[Atlas](#)

[Iniciativas respetuosas del clima](#)

[PARA MAESTROS](#)

[PARA NIÑOS](#)

[NOTICIAS](#)

[ADMINISTRACIÓN](#)

[APOYE A SU PARQUE](#)

[Índice del Sitio](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

[Tienda de Libros](#)

[Contacto](#)



Dermatitis por cercaria

Dermatitis por cercaria

“*Dermatitis por cercaria*” es el nombre que se le da a una enfermedad causada por un platelminto. Este parásito que surge naturalmente necesita para reproducirse de los patos, los caracoles y las cálidas aguas superficiales. Es común encontrarlo en los lagos de 30 estados. El parásito vive en los patos y gansos y libera huevos en las aguas del lago. Estos huevos luego se transforman en pequeñas larvas que buscan caracoles acuáticos dentro de los cuales crecer. Después de incubarse en los caracoles, el parásito se traslada nuevamente a las aves acuáticas en donde madura. Es durante este proceso de búsqueda de un pato o un ganso como huésped que el hombre puede entrar en contacto con este parásito. Se mete debajo de la piel en donde luego muere debido a su incompatibilidad con los humanos.

Si bien no es un problema generalizado y persistente, se cree que el parásito de la “dermatitis por cercaria” está presente en los lagos Mead y Mohave. Mientras se encuentre en aguas cálidas y poco profundas de cualquier lugar por apenas unas semanas o todo el verano, el parásito no representa un riesgo de muerte, pero sí puede causar cierta molestia. Los síntomas incluyen manchas enrojecidas que aparecen en el lapso de unas horas. También puede provocar picazón, inflamación de la piel o verdugones rojos de 10 a 15 horas después. La picazón puede seguir durante varios días, pero todos los síntomas deberían desaparecer en una semana. Solo un tercio de las personas que realmente entra en contacto con este raro organismo contrae “dermatitis por cercaria”.

Para disminuir el riesgo de contraer esta enfermedad, séquese muy bien con una toalla al salir del agua para eliminar los parásitos de su piel. Si es seguro, nade en aguas alejadas de la orilla y evite nadar durante o inmediatamente después de un viento terrestre. Recuerde que en los lagos Mead y Mohave no hay guardavidas.

Si tiene una erupción inexplicable y está preocupado, contacte a su médico.

Última actualización: 1 diciembre, 2011 a las 11:18 EST